

HERUKKAKOI *LAMPRONIA CAPITELLA*

HERUKANSILMUKOI *EUHYPONOMEUTOIDES ALBITHORACELLUS*

- ❖ Esiintyvät koko maassa *Ribes* lajeilla
- ❖ Herukkakoin punaiset toukat talvehtivat maassa ja pensaiden tyvellä ja nousevat keväällä oksille ja kaivautuvat silmuihin
- ❖ Herukansilmukoin vaaleat, myöhemmin vihreäksi muuttuvat toukat talvehtivat silmuissa
- ❖ Molemmilla on yksi sukupolvi vuodessa

Vioitus: Molempien toukat syövät usean silmun kukka- ja lehtiaiheet, jolloin silmut kuihtuvat. Herukkakoi munii raakileisiin, joissa toukat kehittyvät ennen kuin siirtyvät talvehtimaan. Herukansilmukoi munii lehdille, sen toukat kaivautuvat silmuihin heinä-elokuussa. .

Tarkkailu: Keväällä kärkisilmujen puhkeamisen aikaan voi toukkia löytää silmujen sisältä. Aikuisia koiperhosia tarkkaillaan feromonipyydyksillä kesä-heinäkuussa.

Luomutorjunta: Vähän ennen kukinnan alkua voidaan torjua toukkia pyretriinillä ja kesä-heinäkuussa aikuisia ajoittaen torjunta feromonipyydysten saaliin mukaan. Myös feromonipyydyksillä voi olla torjuntavaikutusta. Koko kasvuston alasleikkaus kesäkuun alussa torjuu herukkakoita, syksyllä ja varhain keväällä myös herukansilmukoita.



Koiperhosten toukkien tyhjiksi syömiä silmuja mustaherukalla. Herukkakoin toukka on täysikasvuisena tummapäinen, harmaanvihreä (ylhäällä). Herukansilmukoin toukka on vaalean vihreä, raitakuviainen (alhaalla). Aikuiset on helppo tunnistaa feromonipyydyksessä, ylhäällä herukkakoi, alhaalla herukansilmukoi (Kuvat: Tuomo Tuovinen)