



Kalvning

- Känn igen problem vid förlossning
 - Krystvärkar som inte leder någonstans
 - Blodigt, guldfärgat eller illaluktande sekret från slidan
 - Fosterhinnor som hänger långt utan skymten av en kalv
- Känn efter om livmoderhalsen är öppen
 - Använd gärna seminhandske och rikligt med glidmedel
- Ifall kalven verkar ligga fel få kon att resa sig
 - Underlättar avsevärt möjligheterna att svänga kalven rätt

Kalvning

- Manuell töjning av blygden underlättar framfödande av en stor kalv
- Avbryt dragandet ifall kalvens ben ligger tätt mot bäckenbenet



Checklista över kalvens livsfunktioner

- En kalv bör börja andas senast inom 30 sekunder
 - Om mycket slem finns i andningsvägarna kan man hålla kalven upp-och-ner men inte mycket längre än en minut
- En normal kalv sätter sig i bröstläge och lyfter på huvudet inom några minuter
 - Vid svåra förlossningar tar det i allmänhet längre men över 20 minuter är förknippat med hög dödlighet
- Naveln kontrolleras
 - Ifall den blöder ymnigt binder man om med band
 - Desinfektion med jod för att förhindra bakterieinfektioner

Råmjölkshantering

- Noggrann tvätt av spenarna
- Nedkylning av mjölk som inte används direkt
 - Står sig ett par dagar i kylskåp
 - 1 år nedfrusen
- Mät kvaliteten med hjälp av refraktometer
- Vid upptining av råmjölk



Råmjölk fortsättning

- Mängden råmjölk som kon producerar korrelerar inte nödvändigtvis med kvaliteten
- Kvigor löper mycket större risk att ha svag råmjölk
- Ha alltid tillräcklig mängd bra råmjölk nedfrusen för kommande behov!

Konsumtion av råmjölk

- Målet är 4 liter råmjölk så fort det bara är möjligt
- Nästan hälften av Holstein-kalvar har visat sig dricka 3 liter redan vid första givan.
- Kalvar som dricker mindre än två liter vid första givan bör man överväga att sondmata



Sätt att kontrollera lyckad råmjölksgiva

- Mängden antikroppar i blodet hos en kalv kan lätt mätas i laboratorium eller med snabbtest på gården



Enskild box

- Kalven sätts i en ren och strödd enskild box så fort som möjligt
 - Vikten av en viss isolering växer i takt med att djurantalet växer
- Boxen bör rengöras särskilt noggrant ifall den tidigare invånaren haft diarré
 - Desinfektion utan tvätt är lönlöst
- Användning av torrdesinfektion eller Neporex i botten av boxen minskar flugmängden speciellt sommartid



Hälsokontroll

- En kalv som dricker mindre än normalt vid fler än en mjölkgiva/har druckit avvikande mängd ur automaten det senaste dygnet bör kontrolleras
 - Temperaturen hos en spädkalv $39,5^{\circ}\text{C}$

Socialt umgänge

- Kon är ett flockdjur redan som liten kalv och trivs i sällskap av andra
- På grund av risken för smittospridning bör gruppstorleken emellertid begränsas
 - Gärna under 10 djur tills kalven är ett halvt år

