

# MARJALUDE *DOLYCORIS BACCARUM*

## PELTOLUDE YM. *LYGUS* SPP.

- ❖ Yleisiä koko maassa
- ❖ Talvehtivat aikuisena, useimmiten metsiköissä
- ❖ Lukuisia isäntäkasveja, lisääntyvät monilla rikkakasveilla, etenkin *Lygus*-luteet
- ❖ Yksi sukupolvi vuodessa

**Vioitus:** Etenkin aikuisten, mutta myös toukkien imentävioitus kukinnoissa aiheuttaa raakileiden epämuodostumia, ”nappipäitä”. Marjaluteen imentä aiheuttaa myös haju- ja maku-haittaa marjoihin.

**Tarkkailu:** Touko-kesäkuu, tärkein ajankohta on kukinnan alkaessa. Vatinäyte sopii hyvin tarkkailuun. Etenkin lämpimällä säällä päivittäinen tarkkailu on suositeltavaa.

**Luomutorjunta:** Mansikkarivien rikkakasvitorjunta ja rivivälikasvuston pitäminen lyhyenä. Ruiskutteista luonnon pyretriini (Bioruiskute S) tehoaa luteisiin. Torjunnan ohjeellinen kynnyсарvo: 3-5 ludetta 100 kasvin vatinäytteessä.



Luteiden imentä kukinnoissa aiheuttaa nappipäisiä marjoja ja epämuotoisuutta. Ketolude (*Lygus pratensis*) ja marjalude (alakuva) ovat tavallisimpia ludetuholaisia mansikalla peltoluteen ohella. (Kuvat: Tuomo Tuovinen)